

# Zur Frage der Behandlung von Magen- und Darmgeschwüren mit der Jejunalfonde.

Mit 4 Kurven.

---

## Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde  
einer Hohen medizinischen Fakultät  
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

**Paul Schaumberg**  
appr. Arzt aus Windhuk.

Tag der mündlichen Prüfung: 6. April 1935.

Referent: Prof. Dr. L. R. Müller.

Dekan: Geheimrat Prof. Dr. Fr. Jamin.

Meiner lb. Mutter und meiner lb. Schwester  
in Dankbarkeit gewidmet.



Es ist eine alte Erfahrungstatsache, daß entzündlich erkrankte Organe schneller und besser heilen, wenn es gelingt, während des Heilungsvorganges eine vollständige Ruhigstellung derselben zu erzielen. Diese therapeutische Maßnahme hat sich die Chirurgie schon frühzeitig zunutze gemacht. Es ist das Verdienst von Friedrich von Müller, diese Gesichtspunkte auch für die Therapie innerer Krankheiten geltend gemacht zu haben, wobei man sich natürlich darüber klar war, daß in der inneren Medizin eine totale Ruhigstellung, soweit es lebenswichtige Organe betrifft, aus allzuverständlichen Gründen nicht in Frage kommen konnte.

Geleitet durch diese Überlegungen entwickelte sich hieraus für die innere Medizin die sogenannte „Schonungstherapie.“ Es sei in diesem Zusammenhang kurz an die, ganz besonders in der letzten Zeit wieder in den Vordergrund des therapeutischen Handelns gerückte Durstkur bei der akuten hämorrhagischen Nephritis und ebenso an die Ausschaltung einer Lunge durch die Pneumothoraxbehandlung, die ja fast dem Idealzustand der völligen Ruhigstellung nahek kommt, erinnert. Auf dem Gebiet der Magenerkrankungen wurde es mit dem Ausbau der feineren diagnostischen Methoden, besonders der Röntgenologie ein unbedingtes Bedürfnis auch die therapeutischen Maßnahmen auszubauen, um die Heilungserfolge der internen Therapie zu verbessern. Dies war um so notwendiger, als man nach dem ersten überaus günstig beurteilten chirurgischen Maßnahmen in der Behandlung der Ulcera erkannte, daß auch auf diese Weise das Problem der Therapie keineswegs als gelöst zu betrachten war. Die von interner Seite deshalb nun eingeführte Behandlungsart erhob die Forderung, bei angemessener Ernährung eine völlige Ausschaltung und damit weitgehende Ruhigstellung des Magens zu erreichen.

In diesem Zusammenhange erinnerte man sich an die von *Einhorn* erdachte und zunächst zu therapeutischen

Zwecken angewandte Duodenalsonde. Auch er hat schon damals die Sonde bei schweren Magenblutungen, sowie auch in zahlreichen anderen Fällen, bei denen die Ernährung durch den Mund unmöglich war, angewandt. Von ihm und anderen amerikanischen Ärzten wurde bei dieser Behandlung von Magengeschwüren über günstige Ergebnisse berichtet. Dann aber mehrten sich die Mitteilungen, daß gerade bei längerem Verweilen zahlreiche Komplikationen beobachtet würden, so dauernder Brechreiz und Auftreten von Nasen- und Rachenkatarrhen. Als man infolge des langen Liegens der Duodenalsonde sogar Blutungen sah (v. Noorden) und von chirurgischer Seite (*Konjetzky*) darauf aufmerksam gemacht wurde, daß die Gefahr von Druckgeschwüren an den physiologischen Engen des Mageneinganges und -ausganges und an der Berührungsstelle des Sondenknopfes mit der Darmwand gegeben sei, wurde man in der Beurteilung der Erfolge besonders auf deutscher Seite immer zurückhaltender. *Rehder* erkannte jedoch, daß diese Schwierigkeiten bei der Behandlung lediglich auf technischem Gebiete lagen. Es gelang ihm nun mit Hilfe der Firma Daubitz Berlin eine Sonde aus Gummi von höchster Elastizität und frei von chemisch differenten Stoffen herzustellen. An dem Einführungsende hat man eine schlanke, durchlöchernte Metallolive angebracht, die etwa einen Durchmesser von 5 mm besitzt. Durch diese technische Verbesserung ist es gelungen, die Behandlung von Magenerkrankungen, insbesondere der Magengeschwüre und auch der hochstehenden Duodenalgeschwüre mit der Duodenalsonde zu ermöglichen.

In dieser Abhandlung habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, über die therapeutischen Erfolge, die mit diesem Verfahren in der *Medizinischen Universitätsklinik zu Erlangen* erreicht wurden, zu berichten. Daneben soll auch zu einigen technischen Fragen und Komplikationen und ihrer Vermeidung Stellung genommen werden. An der großen Zahl der Magenkranken, die ich untersuchen und beobachten konnte, war es auch möglich, eine gewisse Beurteilung gegenüber anderen, bisher üblichen therapeutischen Maß-

nahmen bei diesen Erkrankungen zu gewinnen. Ich habe versucht — angeregt durch die früheren Untersuchungen meines verehrten Lehrers, Prof. *L. R. Müller* — in diesem Zusammenhange auch die Schmerz-, Hunger- und Durstempfindungen bei den Kranken zu studieren.

Bevor ich weiter auf Einzelheiten eingehe, möchte ich kurz das Einlegen der Sonde schildern.

Die „Jejunalsonde nach Dr. Rehder“ ist eine 150 cm lange, 4—5 mm im Durchmesser, am Ende mit einer Metallolive versehener Gummischlauch. Von besonderer Bedeutung ist, daß die Sonde aus röntgenundurchlässigem Gummi hergestellt ist, sodaß stets bei den vorgenommenen Kontrolldurchleuchtungen die genaue Lage derselben festgestellt werden konnte.

Sind beide Nasenöffnungen auf ihre Durchgängigkeit geprüft, so wird man das am wegsamsten gefundene Nasenloch zur Einführung des Sonden Schlauches wählen. Sowohl die schlanke Metallolive als auch die nachfolgenden 10—15 cm des Sonden Schlauches werden, um ein besseres Gleiten zu ermöglichen, mit Vaseline eingefettet und nun dieselbe mit der Olive durch die Nase in den Rachenraum eingeführt. Sobald die Olive im Rachenraum erscheint, wird sie mit Hilfe einer Pinzette aus dem Mund herausgeholt und mit einer zweiten Olive, an der im Abstände von 2—3 cm ein 1 qcm großes Schwämmchen mit einem Faden befestigt ist, vertauscht. Bei besonders empfindlichen Patienten, bei denen das Erscheinen der Olive im hinteren Rachenraum starke Würgreizung hervorruft, lassen wir die Olive gleich durch Schluckenlassen von Wasser und schnelles Nachschieben weitergleiten. Obwohl wir auch hier fast ausnahmslos ein ebenso gutes und schnelles Liegen der Sonde beobachtet haben, muß man doch im allgemeinen der „Schwämmchenolive“ den Vorzug geben. Man kann auch Sonden ohne Olive, nur mit Schwämmchen versehen einlegen, auch hier ergeben sich keine besonderen Schwierigkeiten die richtige Lage der Sonde zu erreichen. Nachdem nun die Sonde den Rachenraum passiert hat, werden 60 cm eingeführt, der Patient wird in rechte Seitenlage gebracht und

er selbst schiebt nun in Abständen von 2 Minuten die Sonde um wenige Zentimeter tiefer. Es wurden dann frühzeitig röntgenologische Kontrollen vorgenommen, um ein etwaiges Aufrollen der Sonden im Magen, bis die Sonde wieder im Bild gestreckt erscheint, zu beseitigen. Knotenbildungen, wie sie Rehder beschreibt, haben wir nur in den seltensten Fällen erlebt, und waren gleichfalls überrascht, wie derartig komplizierte Verschlingungen überhaupt zustande kommen können. Das Aufrollen muß fast stets auf ein zu rasches Einschieben der Sonde zurückgeführt werden. Neben der röntgenologischen Kontrolle haben wir noch ein anderes Hilfsmittel angewandt um festzustellen, ob die Sonde im Anfang des Jejunums liegt. Man bläst durch die Sonde Luft ein, liegt dieselbe dann im Duodenum, so ist ein feinblasiges Kollern wahrnehmbar, während das grobblasige Kollern noch auf das Verweilen im Magen schließen ließ. Eine zweite nicht röntgenologische Kontrolle besteht in Ansaugen von Luft. Hier läßt ein Kollapieren der Sonde auf das Liegen im Duodenum schließen, ist sie noch im Magen, so wird man fast stets Sekret ansaugen können. Die röntgenologische Kontrolle wurde solange fortgesetzt, bis die richtige Lage im Jejunum erreicht war. Ebenso wurden alle Sonden einmal in der Woche röntgenologisch kontrolliert, um etwaige Änderungen frühzeitig zu erfassen. Die Patienten gewöhnen sich mit nur ganz wenigen Ausnahmen, (diese werden später erörtert) sehr schnell an die Sonde und der anfängliche Reiz im Rachenraum, bzw. das Gefühl des Vorhandenseins eines Fremdkörpers ist schon am zweiten Tage verschwunden.

Nun möchte ich kurz auf die Ernährung, ihre Handhabung und auf das von uns verwandte Henning'sche Nahrungsmisch eingehen:

Bei einem 60 kg schweren Patienten wurde 1 1/4 Liter Milch, 6 Eier, 50 g Butter, 30 g Weizenmehl, 1/2 Zitrone und 50 g Maizena Traubenzucker verwendet. Dieses Gemisch, das durch ein Sieb gerieben wurde, um Flockenbildung und dadurch ein Verstopfen der Sonde zu vermeiden, wird in 4—5 Portionen zu 250—300 ccm gegeben. Stellte sich

heraus, daß die Nahrungsmenge, bei der einzelnen Mahlzeit zu viel war, so sind wir auf 200 ccm zurückgegangen, und haben dafür dann öfter gefüttert. Die Patienten klagten anfänglich größtenteils über starkes Völlegefühl nach der Fütterung und glaubten mit weit weniger Nahrung auskommen zu können, doch war hier die oft größere Gewichtsabnahme, die zu einer Mehrgabe an Nahrungsgemisch mahnte, maßgebend. Nachstehende Kurve Nr. 3, soll einen Überblick über die durchschnittliche tägliche Menge der Sondenkost geben, bzw. wie oft täglich die Fütterung stattfand.

Um der Deckung des Flüssigkeitsbedarfes gerecht zu werden, wurden nach jeder Nahrungsaufnahme noch reichliche Mengen Tee durch die Sonde gegeben, die auch gleichzeitig die notwendige Säuberung derselben bezweckten. Während der ganzen Kur ist Bettruhe notwendig, schon um größere Gewichtsabnahmen zu vermeiden, ebenso wird man auf die Ruhe an sich keineswegs verzichten können.

Der etwa 30 cm über dem Bett mit dem Nahrungsgemisch angebrachte Irrigator wurde nun, nachdem noch ein Glasrohr zur Abflußkontrolle zwischengeschaltet war, mit dem Nasenende der Sonde verbunden. Wichtig ist, daß das Nährgemisch nicht unter zu hohem Druck in den Darm gelangt, um nicht unnötig die Darmschleimhaut zu reizen, und dadurch für den Patienten unangenehme Nebenerscheinungen, wie Herzklopfen etc. (über letztere Erscheinungen sei später noch gesprochen) herbeizuführen. Das Einfließen der Nahrung hat eine Zeit von 20 Minuten beansprucht. Um eine nicht allzustarke Abkühlung des Nährgemisches zuzulassen, wurde dasselbe in ein heißes Wasserbad gestellt.

Nach den Erfahrungen von Rehder ist ein Verweilen der Sonde von 30 Tagen notwendig um wirklich Erfolge zu erzielen. Wir haben uns zunächst auf Rehders Erfahrungen gestützt und die Sonde ebensolange liegen gelassen. Diese 30 tägige Verweilzeit halten wir heute noch bei chronischen Geschwüren für unbedingt erforderlich. Bei Fällen, bei denen wir annehmen konnten, daß es sich um frische

Ulcera handelt, haben wir die Erfahrung gemacht, daß ein 21 tägliches Verweilen der Sonde genügt. Soweit es sich bisher übersehen läßt, kann man mit dieser kürzeren Verweilzeit dieselben Erfolge auch hinsichtlich des Dauererfolges erzielen.

Im allgemeinen möchte ich mich doch dahin aussprechen, daß man die 30 Tage der Sondenverweilung beibehält. Für eine längere Dauer haben wir uns nie entschließen können (nur ganz ausnahmsweise und probeweise), da mit der Länge der Sondenkur doch ein gewisser Reiz des Jejunums auftreten kann, der wiederum eine Störung für die Nachbehandlungsperiode bedeutet.

Wohl mit am maßgebendsten bei der Sondenkur ist die regelmäßige Stuhlkontrolle auf Blut, die bei uns auch alle 3—4 Tage ausgeführt wurde.

Während der Kur haben wir weiterhin besonderen Wert auf eine gute allgemeine Pflege gelegt. So haben wir täglich das Nasenende der Sonde mit Borvaseline eingefettet. Fernerhin ließen wir mehrmals täglich (5—6 mal) mit Wasserstoffsuperoxyd gurgeln und des öfteren einen Schluck Wasser trinken. Die Sonde selbst wurde sowohl vor, als auch nach den Fütterungen mit reichlich Tee durchgespült, um wie schon gesagt, ein Verstopfen zu verhindern. Auf das bei Rehder hingewiesene Verschieben der Sonde haben wir verzichtet, denn sowohl der ständige Lagewechsel des Patienten, als auch die Darmperistaltik erledigen das Verschieben von selbst, sodaß man eine besondere Reizung der Darm[schleim]haut durch die Metallolive nicht zu befürchten braucht.

Anschließend an die Sondenbehandlung haben wir bei den Patienten noch eine gekürzte *Leube'sche* Ulkuskur durchgeführt, d. h. nach Entfernung der Sonde wurde noch 2—3 Tage flüssige Nahrung gegeben, an den nächstfolgenden drei Tagen breiige Kost und dann erst zu festerer Nahrung übergegangen. Nur in ganz einzelnen Fällen traten bei Nahrungsaufnahme per os wieder Schmerzen auf und man kann wohl sagen, daß diese Fälle als im Kern nicht heilbar zu betrachten sind. Hier ist fast ausnahmslos nur noch auf operativem Wege mit einem Erfolg zu rechnen.

Unsere Erfahrungen stützten sich auf ca. 100 Fälle, die in einem Zeitraum von 2 1/2 Jahren (bis Juli 1933) von uns behandelt wurden. Wir wollen zuerst die röntgenologisch sicher nachgewiesenen Ulcera ventriculi und anschließend die Ulcera duodeni besprechen.

Bei den Ulcera ventriculi unterscheiden wir:

1. Ulcera, die mit einer starken Blutung einhergingen, sich entweder in Form einer Hämatemesis oder einer Malena demonstrierten.

2. Frische Ulcera, unter diesen haben wir alle Fälle zusammengefaßt, die erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit über Magenschmerzen klagten und außerdem bisher noch nicht behandelt wurden.

3. Chronische Ulcera, d.h. Fälle, bei denen schon vor Jahren die Diagnose gestellt wurde und die schon früher mit anderen Kuren behandelt wurden.

Die Ulcera duodeni haben wir eingeteilt

1. in relativ frische Ulcera

2. in Ulcera duodeni mit schweren sekundären Veränderungen am bulbus

3. Fälle, bei denen man auf Grund der Symptome annehmen muß, daß es sich um ein Ulcus duodeni handelt jedoch röntgenologisch eine sichere Nische nicht dargestellt werden konnte.

Die mit der Sonde behandelten Ulcera ventriculi belaufen sich auf 30 Fälle. Einwandfrei röntgenologisch festgestellt waren 22 Fälle, bei 5 Fällen fand sich ein röntgenologisch nischenverdächtiger Fleck. Zusammen mit den klinischen Symptomen und der Anamnese konnte kein Zweifel über die Diagnose bestehen. Bei 3 Fällen lag auf Grund der Anamnese die Diagnose Ulcus ventriculi sehr nahe. Ulcera mit starken Blutungen konnten 3 festgestellt werden. Die Zahl der frischen Ulcera belief sich auf 11. Die schon früher mit anderen Kuren behandelten Fälle, die wir als chronische Ulcera ventriculi zusammengefaßt haben, beliefen sich auf 14, von denen 4 früher in der hiesigen Klinik mit der Leube'schen Diätkur behandelt worden waren, während die übrigen Fälle zunächst in Behandlung eines praktischen Arztes gestanden haben und

später zu uns zur Kur eingewiesen wurden. In 2 Fällen bestand schon seit Jahren ein röntgenologisch einwandfreies Ulcus ventriculi.

Die von mir errechnete durchschnittliche Sondendauer bei den Ulcera ventriculi betrug 26 Tage. Die Dauer der Kur schwankte zwischen 3 und 41 Tagen. Hier möchte ich auf Fälle, bei denen Komplikation auftraten, eingehen. Gleichzeitig sollen die kurz Erwähnung finden, bei denen eine frühzeitige Unterbrechung der Sondenbehandlung notwendig war.

#### Fall 1

(röntgenologische Diagnose: Ulc. vent. mit pylorusstenose)

Die Patientin hatte schon einmal bei uns eine Leube'sche Diätkur mitgemacht und wurde als gebessert, jedoch nicht ganz beschwerdefrei nach 6 Wochen entlassen. Wir rieten zur Operation, doch konnte sie sich nicht dazu entschließen. Nach 4 Wochen kam Patientin wieder mit starken Schmerzen und verlangte unbedingt, die bei einer anderen Patientin mit so gutem Erfolg durchgeführte Sondenkur mitzumachen. Die hochgradige Pylorusstenose lies jedoch eine Sondenpassage nicht zu. Eine anschließend vorgenommene 5 wöchentliche Leube'sche Diätkur hatte Beschwerdefreiheit zur Folge. Eine Nachuntersuchung konnte aus äußeren Gründen bisher nicht erfolgen.

#### Fall 2

(röntgenol. Diagnose: einwandfreies Ulc. vent.)

Dieses (und später noch ein aufgezeichneter Fall) ist der uns einzig bekannte Fall, wo ein Patient nach Liegen der Sonde über noch heftigere Schmerzen als zuvor klagte, sodaß wir daher gezwungen waren, am 3. Tage die Kur abzubrechen. Die anschließend 4 Wochen durchgeführte Leube'sche Diätkur brachte auch keine merklliche Besserung. Die vorgeschlagene Operation wurde auch hier abgelehnt.

#### Fall 3

(röntgenol. Diagnose: einwandfreies Ulc. vent.)

Ein 2 tägiger Versuch, die Sonde ins Duodenum zu bringen, war erfolglos. Ein Grund für das Mißlingen der

Sondenlegung konnte nicht ermittelt werden! Gaben von spasmolytischen Mitteln (Natrium bicarbonicum und warmes Olivenöl) hatten in diesem Falle keinen Erfolg. Die abgeschlossene Leube'sche Diätkur von 5 Wochen machte den Patienten beschwerdefrei. (Nach 1/2 Jahr Auftreten der alten Beschwerden.)

#### Fall 4

(röntgenol. Diagnose: einwandfreies Ulc. vent.)

Auf das Einführen der Sonde antwortet Patient mit ziemlich starkem Brechreiz. Nach 4 Stunden lag die Sonde gut, nach 6 Stunden wurde sie jedoch erbrochen. Ein nochmaliger Versuch am 2. Tage brachte die Sonde wiederum gut ins Duodenum, wurde jedoch abermals erbrochen. Nachdem der Brechreiz nicht zu stillen war, wurde eine Leube'sche Diätkur von 4 Wochen durchgeführt. (Beschwerdefrei entlassen, nach 1/2 Jahre Auftreten der alten Schmerzen, nach 1 Jahre wiederum Auffuchen der Klinik).

#### Fall 5

(röntgenolog. Diagnose: Verdacht Ulc. vent.)

Die Sonde kommt nach dauerndem Brechreiz erst am 3. Tage ins Duodenum zu liegen, am 5. Tage Aufhören des Brechreizes, bis zum 15. Tage ist Patient beschwerdefrei, erbricht die Sonde jedoch und es wird 20 cm oberhalb der Olive ein Riß im Sonden Schlauch festgestellt. Nach Einführung einer neuen Sonde bleibt Patient bis zum Ende der Kur beschwerdefrei und wird so auch entlassen.

#### Fall 6

(röntgenol. Diagnose: einwandfreies Ulc. vent.)

Nachdem die Sonde 5 Tage lang gut lag, hörten am 6. Tage bei der Fütterung der Nahrungsstrom auf zu laufen. Die vorgenommene Röntgenkontrolle ergab Abknickung der Sonde im Magen. Die Sonde wurde daraufhin soweit herausgezogen, bis sie im Röntgenbild gestreckt erschien, worauf die Nahrung wieder normal lief. Die Kur konnte erfolgreich zu Ende geführt und Patient beschwerdefrei entlassen werden.

### Fall 7

(röntgenol. Diagnose: einwandfreies Ulc. vent.).

Nach zweimaligem Erbrechen der Sonde innerhalb 2 Tage glaubt Patient die Sonde nicht mehr vertragen zu können. Es wird daher anschließend eine Leube'sche Diätkur durchgeführt. Nachdem aber trotzdem das Erbrechen und die Schmerzen nicht nachließen, entschloß Patient sich am 20. Tage zur Operation.

### Fall 8

(röntgenolog. Diagnose: einwandfreies Ulc. vent.)

Patientin mußte am 5. Tage der Sondenbehandlung wegen häuslicher Verhältnisse die Klinik verlassen. Am 2. Tage war sie bereits vollkommen beschwerdefrei.

Bei 2 Patienten trat das von Rehder als „Jenunokardiale bezeichnete Syndrom“ auf. Letzteres äußerte sich neben krampfartigen Schmerzen im Oberbauch (es waren wie die Patienten angaben nicht die sonstigen Schmerzen) durch Herzklopfen, Schwächeanwandlung und Schweißausbruch, das Gesicht wurde blaß und die Patienten bekamen ein kollapsähnliches Aussehen.

Diese Erscheinungen sind, worauf Henning auch hinweist, auf einen Ringkrampf, der reflektorisch vom Darm über den Vagus die Herznervation mitreizt, zurückzuführen. Die hauptsächlichste Ursache dieses Vagusreizes ist wohl auf die unzumutbare Fütterung zurückzuführen, so hören auch die Patienten, sobald sie die ersten Anzeichen des Auftretens des „Jenunokardialen Syndroms“ bemerken, reflektorisch mit der Fütterung auf. Rehder meint, daß der ausströmende Nahrungsstrahl mit zu starkem Druck die Schleimhaut trifft und somit ein mechanischer Reiz stattfindet. Man kann dies auf einfache Weise dadurch beseitigen, indem der Irrigator niedriger gehängt wird, sodaß die Nahrung nur tropfenweise unter geringem Druck einlaufen kann.

Von allen 30 Patienten haben nur 3 während der Kur noch über zeitweise geringe Schmerzen geklagt, jedoch

hat es sich nach den Aussagen der Patienten dabei nicht um die früheren typischen Ulcus-schmerzen, sondern mehr um ein Unbehagen gehandelt. Auch diese waren nach abgeschlossener Kur beschwerdefrei.

Bemerkenswert ist, daß über die Hälfte der Patienten nach der Einführung der Sonde bereits am 2. bis 3. Tage schlagartig schmerzfrei waren. Wohl traten bei dem einen oder anderen die nie ganz zu vermeidenden Nebenerscheinungen, wie Völlegefühl, Aufstoßen, auch zeitweises Druckgefühl auf, doch waren diese Erscheinungen, wie sich die Patienten selbst ausdrückten „auszuhalten“ und „nicht mit den früheren Schmerzen zu vergleichen.“

Dadurch, daß die Patienten schmerzfrei werden, wird dem Arzt besonders die psychische Behandlung auffallend leicht gemacht.

Es scheint uns angezeigt, in diesem Zusammenhang kurz auf die Entstehung der Magenschmerzen einzugehen. Obwohl viel über das Zustandekommen derselben gearbeitet wurde, ist man bisher zu einer eindeutigen Auffassung noch nicht gekommen. Nach L.R. Müller darf man heute als gesichert annehmen, daß es eine Sensibilität der Magenschleimhaut selbst nicht gibt und somit Temperaturen und mechanische Reize keinerlei Empfindungen hervorrufen können. Auch bei den röntgenologisch nachgewiesenen *Ulcera ventriculi* also „Verletzungen“ der Magenschleimhaut und der darunter befindlichen Muskelschicht treten häufig keinerlei Beschwerden auf. So stellt gar nicht allzu selten eine schwere Magenblutung das erste alarmierende Symptom der Erkrankung dar. Ebenso können wir beobachten, daß bei akuten Perforationen von Geschwüren häufig eine atypische Magenanamnese fehlt. Einen gewissen Hinweis für die Entstehung der Schmerzen mag uns das Auftreten derselben in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme geben. Ein Patient mit einwandfrei nachgewiesenem *Ulcus ventriculi* klagt nicht etwa sofort mit Nahrungsaufnahme, sondern gewöhnlich erst einige Zeit später über Schmerzen. Durch röntgenologische Untersuchung konnte nachgewiesen werden, daß die Schmerzen mit der Austreibungsperiode zu-

sammenfallen, d. h. also daß sie zu der Zeit auftreten, wo gleichzeitig eine vermehrte Peristaltik einsetzt.

Die früher weit vertretene Ansicht, daß etwa die freie Salzsäure für die Magenschmerzen verantwortlich gemacht werden müsse, konnte durch die Untersuchungen L. R. Müllers widerlegt werden. Jedenfalls besteht keinerlei Parallele zwischen der Stärke der Schmerzen und der Höhe der Säurewerte. Ulcera mit normalen Säurewerten, oder sogar anaciden Werten können Beschwerden auslösen.

So sieht L. R. Müller die Ursachen des Magenschmerzes in den spastischen Kontraktionen während der Ausstoßungszeit.

Die Sondenernährung stellt nun für die Annahme, daß die Schmerzen durch vermehrte Kontraktionen des Magens ausgelöst werden, eine weitere Beweiskraft dar.

Da mit dem Liegen der Sonde schlagartig bei fast allen Kranken die Schmerzen aufhören, dürfte dies nur so erklärt werden können, daß mit Ausschaltung des Magens auch die starken schmerzhaften Kontraktionen wegfallen.

In diesem Zusammenhange ist die von *Norpoth* gemachte Beobachtung wichtig, daß bei allen Versuchspersonen ausnahmslos unmittelbar nach der Injektion der Nahrung in den Darm eine völlige Ruhigstellung des Magens vorhanden war und diese fast regelmäßig bis zur nächsten Injektion fort dauerte. Auch *H. G. Scholz* bestätigt diese völlige Ruhigstellung des Magens während der Sondenernährung. Zu diesem Zwecke führte er Untersuchungen über die Magenmotilität mit der Ballonmethode von *Danielopolu* (Luftfüllung) bei Ulcuskranken aus und bewies an Hand von Registrierkurven, daß tatsächlich während der Sondenernährung die Magenbewegungen aufhören.

Die von *H. G. Scholz* und *Brugsch* beschriebene und auch von uns zur Kontrolle angewandte Methode der Einführung eines gewöhnlichen Duodenalschlauches zur Erforschung der Magensekretion während der Sondenbehandlung ergab folgendes:

Es konnte eine deutliche Senkung des Niveaus der Nüchternsekretion und der Aciditätswerte während der

Sondenbehandlung gegenüber der vor- und nachherigen Untersuchungen bei Breidiät festgestellt werden. Es folgt daraus, daß während der Sondenernährung eine wesentlich stärkere sekretorische Ruhigstellung des Magens auftritt und somit die für die Ausheilung notwendige auf ein Minimum herabgesetzte Sekretion tatsächlich vorhanden ist und somit sind alle Voraussetzungen zur Heilung der Geschwüre gegeben.

So darf wohl gesagt werden, daß mit dem Liegen der Sonde bei der Mehrzahl der Kranken die Kontraktionen des Magens auf ein Minimum herabgesetzt werden, gleichzeitig wird die Sekretion günstig beeinflusst. Aus diesen beiden entscheidenden Faktoren ergibt sich die völlige Schmerzfreiheit während der Kur und der große Heilerfolg bei den Sondenbehandelten.

Bei *Ulcus ventriculi* Fällen war nicht ein einziger, der über Hunger klagte, während wir bei den später zu betrachtenden Duodenal-Fällen zwei beobachten konnten.

Von seiten des Stuhlganges traten in einzelnen Fällen nur in den ersten Tagen Schwierigkeiten auf und zwar im Sinne von Obstipationen, die aber durch leichte Abführmittel, durch die Sonde gegeben, beseitigt werden konnten. Manchmal traten auch in den ersten Tagen Durchfälle auf, so besonders während der heißen Jahreszeit. Die Ursache lag wohl einmal an der peptonisierten Milch, andererseits an der gegebenen Zuckermenge, die schlecht vertragen wurde. Wir haben dann durch Änderung der Nahrungszusammensetzung und auch der Nahrungsmenge gute Erfolge erzielt. Nur selten ließ es sich nicht umgehen, auch von Opiaten Gebrauch zu machen.

Untersuchungen auf Blut, die wir jede Woche ausgeführt haben, waren in 90%, spätestens in der 2. Woche negativ, die Hälfte bereits am Ende der ersten Woche.

Patienten, die bei frisch blutenden *Ulcera* einen herabgesetzten Hämoglobingehalt hatten, haben wir mit sehr gutem Erfolg mit Inhepton-Injektionen behandelt. So stieg bei einem Patienten, der mit 54% Hämoglobin in die Klinik eintrat, bereits nach 3 Wochen das Hämoglobin auf 85%.

Die Gewichtsabnahme bei den mit der Sonde behandelten *Ulcus ventriculi* Kranken betrug während der 26-tägigen Sondenkur durchschnittlich 2,6 kg. Hier sei jedoch bemerkt, daß sich darunter Patienten befanden, die eine 8—10 pfündige Gewichtsabnahme zu verzeichnen hatten; während die Mehrzahl nur 1—2 kg an Gewicht verloren. Man wird diese Abnahme im wesentlichen auf Wasserverlust zurückführen müssen. Ein Patient sei erwähnt, der hier von eine Ausnahme machte und während der Sondenkur eine Gewichtszunahme von 3 kg aufwies.

Die anschließend an die Sondenkur durchgeführte Leube'sche Diätkur betrug im Durchschnitt 12 Tage, sodaß am 3. Tage die erste U.K., am 7. Tage die zweite U.K., am 10. Tage die dritte U.K. und so fort gegeben wurde.

Die Patienten sprachen hier durchwegs mit einer sehr guten Gewichtszunahme an, sodaß wir sie, nachdem sie das bei der Sondenkur verlorene Gewicht aufgeholt hatten, noch mit einem durchschnittlichen Mehrgewicht (bezogen auf ihr Eintrittsgewicht) von 1,2 kg entlassen konnten. Besonders auffallend war hier die Gewichtszunahme während der ersten 3—5 Tage der Leube'schen Diätkur. Es war während dieser Zeit eine durchschnittliche Gewichtszunahme von 3—4 Pfund festzustellen, ja es gab Patienten, die bis 5 und 7 Pfund zunahmen. Diejenigen, die ihr altes Gewicht bei uns nicht erreichten, verließen entweder sofort oder nach 3—5 Tagen aus irgendwelchen dringenden Gründen die Klinik.

Allen diesen Patienten wurde für das nächste halbe Jahr eine strenge Diätvorschrift mitgegeben. Die Nachuntersuchungen, die teilweise in der Klinik, teilweise aber auch vom praktischen Arzt durchgeführt wurden, ergaben ein gutes Resultat, sowohl hinsichtlich der Beschwerden als auch des Gewichtes. So konnten Gewichtszunahmen bis zu 20 Pfund festgestellt werden. Ich habe auf Grund der noch später aufzuführenden Vergleiche mit anderen, nicht mit der Sonde behandelten *Ulcera* feststellen können, daß das Gewicht mit ein Gradmesser für die Heilung der *Ulcera* darstellt.

Unter diesen obigen 30 Fällen waren 4 Ulcera, die in der hiesigen Klinik schon vorher mit einer Leube'schen Diätkur behandelt waren; den erwünschten Erfolg brachte jedoch erst eine Sondenbehandlung. Alle 4 Fälle waren röntgenologisch einwandfrei nachgewiesene Ulcera ventriculi. Diese seien hier kurz besprochen:

Fall 1.

Nach 4 wöchentlicher Leube'scher Diätkur beschwerdefrei entlassen. Nach 1/2 jähriger Beschwerdefreiheit zeitweises Auftreten der alten Schmerzen trotz strengster Diät. Zwischendurch wieder Beschwerdefreiheit. Nach 1 Jahre Auffuchen unserer Klinik mit dem alten Beschwerden. Am 3. Tage nach Liegen der Sonde ist Patient bereits beschwerdefrei. Nach 28 tägiger Sondenbehandlung und anschließender 12 tägiger Leube'scher Diätkur wurde er beschwerdefrei entlassen. Jetzt seit 2 Jahren voll arbeitsfähig.

Fall 2.

Nach 5 wöchentlicher Leube'scher Diätkur gebessert entlassen. Nach 1/2 Jahr wiederum Auftreten der alten Schmerzen trotz dauernder Diät. Nach 1 Jahr sucht Patient mit den alten Beschwerden die Klinik wieder auf. Nach 25 tägiger Sondenbehandlung und anschließender Leube'scher Diätkur wurde Patient beschwerdefrei entlassen. Nach 1 1/2 Jahren ohne Beschwerden arbeitsfähig.

Fall 3.

Nach 6 wöchentlicher Leub. D.K. gebessert entlassen. Nach 4 Wochen zeitweise Auftreten der alten Beschwerden. Zwischendurch war Patient bei entsprechender Diät immer wieder beschwerdefrei. Nach 14 Monaten suchte er die Klinik mit dem alten Beschwerden wieder auf. Nach 28 tägiger Sondenbehandlung mit anschließender 15 tägiger Leube'scher Diät beschwerdefrei bis zum heutigen Tage, also seit 2 Jahren.

Fall 4.

Nach 5 wöchentlicher Leub. D.K. gebessert entlassen. Nach 8 wöchentlichem schmerzfreien Intervall Auftreten der alten Beschwerden. Nach 1/2 Jahr sucht Patient die Klinik

wieder auf. Nach 30 tägiger Sondenkur, anschließender 14 tägiger Leube'scher Diätkur seit 1½ Jahren beschwerdefrei.

Diese vier Fälle zeigen, daß nach Versagen einer Leube'schen Kur die Sondenkur noch den gewünschten Erfolg bringen kann. Diese Erfahrung kann bei Patienten, die sich zu einer Operation nicht entschließen können von therapeutischer Bedeutung sein.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die mit der Sonde behandelten *Ulcera ventriculi*, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sowohl hinsichtlich der Beschwerdefreiheit während der Kur, als auch des Dauererfolges gute Ergebnisse zeitigten.

Nun sollen noch die mit der Sonde behandelten 70 Fälle von *Ulcus duodeni* kurz betrachtet werden: Röntgenologisch einwandfrei nachgewiesen waren 56 Fälle, bei 11 Fällen fand sich ein nißchenverdächtiger Fleck, während bei 3 Fällen nur auf Grund der typischen Symptome die Diagnose gestellt wurde.

Die durchschnittliche Sondendauer bei den *Ulcera duodeni* betrug 24 Tage, der durchschnittliche Gewichtsverlust während dieser Zeit 3,2 kg. Die anschließend durchgeführte Leube'sche Diätkur nahm durchschnittlich 12 Tage in Anspruch. Nachdem die Patienten ihren Gewichtsverlust wett gemacht hatten, hatten sie bis zum Verlassen der Klinik ein durchschnittliches Mehrgewicht von 1 kg. Im Laufe der nächsten Woche nahmen sie meist noch 10 Pfund und mehr zu.

Bei 6 Fällen von 70 konnte die Kur nicht zu Ende geführt werden oder es stellten sich Komplikationen ein. Sie seien kurz angeführt:

#### Fall 1

(röntgenol. Diagn. einwandfreies *Ulc. duod.*)

Trotzdem die Sonde gut lag, mußte sie am 3. Tage entfernt werden, da Patient glaubte, sie nicht vertragen zu können und heftigere Schmerzen als vorher bestanden. Auch eine anschließend vorgenommene Leube'sche Diätkur von 4 Wochen brachte keinen Erfolg. Zwischendurch traten stärkere Blutungen auf. Wir rieten zur Operation, die jedoch abgelehnt wurde.

### Fall 2

(röntgenol. Diagn. einwandfreies Ulc. duod.).

Nach 3 Tagen mußte Patient aus beruflichen Gründen die Klinik wieder verlassen. Am 2. Tage war er bereits schmerzfrei. Eine später durchgeführte Sondenkur war von vollem Erfolg gekrönt.

### Fall 3

(röntgenolog. Diagn. Verdacht auf Ulc. duod.).

Hier gelang es nicht die Sonde ins Duodenum zu bringen. Deshalb wurde eine Leube'sche Diätkur von 4 Wochen durchgeführt und Patient gebessert entlassen.

### Fall 4

(röntgenolog. Diagn. Verdacht auf Ulc. duod. mit Blutungen).

Bei dieser Patientin mußte die Sonde, obwohl sie gut lag, auf Wunsch am 2. Tage entfernt werden, da sie „vermeinte, stärkere Schmerzen zu verspüren“. Gleichzeitig kam noch eine Angina hinzu. Nach 4 wöchentlichen Leub. D. K. wurde sie gebessert entlassen.

### Fall 5

(röntgenol. Diag. Typische Bulbuschrumpfung,  
kleinere Nische mit Faltenstern).

Nach 18 Tagen platzte die Sonde und wurde kurz darauf erbrochen. Diese Zeit genügte jedoch zusammen mit der anschließend durchgeführten 5 wöchentlichen Leub. D. K. den Patienten beschwerdefrei zu entlassen. Er war dies auch noch nach 1 1/2 Jahren.

### Fall 6

(röntgenolog. Diagn. Nischenfleck und spastische Einziehung am Bulbus duodeni).

Patient erbricht am 7. Tage die Sonde, nachdem er am Tage vorher geäußert hat, zu glauben, die Sonde nicht mehr weiter zu vertragen. Die Schmerzen hatten schlagartig nach Liegen der Sonde am 2. Tage aufgehört. Die anschließend durchgeführte Leube'sche Diätkur ließ die alten Schmerzen wieder auftreten und so entschloß sich Patient auf Anraten am 12. Tage zur Operation.

Bei Betrachtung sämtlicher mit der Sonde behandelten *Ulcera duodeni* konnte ich feststellen, daß 56 Patienten vollständig beschwerdefrei entlassen wurden. Nachuntersuchungen bei 80% der Fälle ergaben gute Resultate, ganz besonders hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit. Einige Patienten gaben am Schluß der Behandlung noch geringes Druckgefühl im Epigastrium an, jedoch waren die früheren eigentlichen Schmerzen völlig verschwunden. Die Fälle, besonders wenn sie nach einer zweiten Sondenkur nicht beschwerdefrei wurden, müssen eben auf Grund der sekundären Veränderungen des Bulbus (wie auch bei 2 Fällen die Operation periduodenale Verwachsungen ergab) zu jenen zählen, die dem Chirurgen gehören. Nachdem wir auf Grund der Erfahrungen unsere Indikationsstellung enger gezogen haben, werden die Fälle sofort der chirurgischen Behandlung zugeführt.

In zwei Fällen kam es zum Platzen der Sonde, beide Male am 18. Tage. Diese Zeit genügte jedoch, um die Patienten nach anschließender 12 tägiger Leube'scher Diätkur beschwerdefrei zu entlassen.

Des öfteren klagten die Patienten auch über manchmal stärkeres, manchmal weniger starkes Druck- und Völlegefühl nach dem Einlaufen der Sondenkost. Zeitweise auch Aufstoßen. Dieses waren jedoch nur ab und zu auftretende Nebenerscheinungen.

Bei 2 Patienten konnte trotz Völlegefühls Hungerempfindungen wahrgenommen werden. Bei einem sogar Heißhunger. Diese Erscheinung legte sich jedoch bald wieder und wurde durch Mehrgabe von Nahrung behoben.

Zunächst erscheint es fast unverständlich, daß nicht alle Patienten über Hungergefühl zu klagen haben, da doch während der ganzen Kur der Magen „leer“ ist. So wird die von manchen Autoren vertretene Ansicht, daß „Leere im Magen“ Hunger hervorruft, wiederlegt. Die von L. R. Müller sowie anderen Autoren aufgestellte These, daß die Hungerempfindung nicht organgebunden ist, findet hierdurch weitere Bestätigung.

Bei beiden Patienten, die über Hunger zu klagen hatten, verschwand nach einer Mehrgabe von Nahrung das Hungergefühl. Man wird also auch hier nach L. R. Müller eine Verarmung des Gewebes und des Blutes an Nahrungstoffen als direkte Ursache der Hungerempfindung ansehen müssen.

Der Magen kann „nicht leerer als leer werden“, wie L. R. Müller sagt und so deutet der Umstand, daß nach körperlicher Arbeit der Hunger zunimmt, darauf hin, daß der Mangel an Nahrungstoffen im Blut die Hungerempfindung auslöst. Auch die Untersuchungen, daß das Auftreten von Hunger mit Senkung des Blutzuckers einhergeht, spricht in diesem Sinne. Es ist eine Erfahrungstatfache, daß durch Rauchen, also Nikotingenuß das Hungergefühl zum Verschwinden gebracht werden kann. Unsere Untersuchungen haben ergeben, das Nikotin in der Lage ist, den Blutzucker zu steigern. Der Einwand, daß Diabetiker dann niemals Hungergefühl haben dürften, wird dadurch entkräftigt, daß hier auch wiederum die Niveaueinstellung von Bedeutung ist, genau wie Diabetiker schon bei einem sonst noch normalen Blutzuckerwert ein hypoglykämisches Blutbild bieten können. So könnte man sich vorstellen, daß bei nur geringer Senkung deselben Hungergefühl ausgelöst wird.

Daß durch Hunger Leerkontraktionen des Magens hervorgerufen werden, ist röntgenologisch erwiesen. Die Patienten haben eigenartigerweise ein ständiges Sättigungsgefühl aufzuweisen, so daß auch „Leerkontraktionen“ nicht zur Beobachtung kommen. Dies mag für die zur Heilung notwendige Ruhigstellung von großer Bedeutung sein.

Nun seien auch noch die in der hiesigen Klinik schon mit Leubescher Diätkur behandelten Fälle von *Ulcera duodeni* besprochen, die erst auf Sondenbehandlung hin als geheilt, bzw. endgültig beschwerdefrei gelten dürfen:

#### Fall 1

(röntgenol. Diagn.: nischenverdächtiger Fleck und Einziehung am Bulbus).

Patient wurde 4 Wochen mit Leub. D. K. behandelt und als gebessert entlassen, hielt draußen weiterhin Diät.

Nach 3 Monaten Auftreten der alten Beschwerden, die im Laufe der Zeit immer heftiger werden, sodaß er 10 Monate nach seiner Entlassung die Klinik wieder aufsucht. Am 2. Tage der Sonde ist Patient beschwerdefrei und wird sofort nach 23 tägiger Sondenbehandlung aus geschäftlichen Gründen nach Hause entlassen. Nach  $\frac{1}{2}$  Jahr erscheint er wieder mit einem Mehrgewicht von 12 Pfund und völlig beschwerdefrei, was er auch noch nach einem weiteren Jahr war.

#### Fall 2

(röntgenol. Diagn. ulcusverdächtiger Fleck am Pylorus).

Nach 4 wöchentlicher Leub. D. K. wird Patient beschwerdefrei entlassen, bleibt es jedoch nur weitere 6 Wochen trotz strengster Diät. Nach 3 Monaten sucht er die Klinik wieder auf. Nach 24 tägiger Sondenkur und anschließender 18 tägiger Leub. D. K. wird er beschwerdefrei entlassen und war es auch noch nach  $1\frac{1}{2}$  Jahren.

#### Fall 3

(röntgenol. Diagn. Ulc. duodeni).

Patient macht schon dreimal eine Leub. D. K. von 4, 5 und 6 Wochen mit, wurde immer als gebessert entlassen, jedoch traten jedesmal nach 6—8 Wochen die alten Beschwerden wieder auf. In fast regelmäßigen Abständen von 6—8 Monaten kam er zu einer neuen Kur. Zuletzt 32 täg. Sondenkur mit anschließender 3 wöchentlicher Leub. D. K. Dieses Mal wurde er beschwerdefrei und mit einem Mehrgewicht von 7 Pfund entlassen. Nach einem Jahr hatte er 10 Pfund zugenommen und war völlig beschwerdefrei. (Seitdem nicht mehr nachuntersucht).

#### Fall 4

(röntgenol. Diagn. Nische an der Hinterwand m. Faltenstern).

Patient wurde nach 4 wöchentlicher Leub. D. K. gebessert, jedoch nicht ganz beschwerdefrei entlassen. Die auch draußen weiter geführte Diätkur brachte ihm keine Besserung und so kam er nach 4 Monaten, um die Sondenkur, die bei einem Kollegen so guten Erfolg hatte, ebenfalls mitzumachen. Nach 23 tägiger Sonden- und 10 tägiger Ulcuskur wurde er beschwerdefrei entlassen. Nach  $1\frac{1}{2}$  Jahren ohne Rezidiv.

### Fall 5

(röntgenol. Diagn. nischenverdächtiger Fleck mit Einziehung,  
Verdacht auf Ulc. duod.).

Nach 8 wöchentlicher Leub. D. K. zeitweises Auftreten der alten Schmerzen. Nach 2 Monaten kommt Patient wieder in die Klinik um sich der damals abgeschlagenen Sondenkur zu unterziehen. Am 3. Tage ist er völlig beschwerdefrei und „übergücklich“. Nach 22 Tagen Sondenkur und anschließender 10 tägiger Leub. D. K. wird er beschwerdefrei entlassen. Nach 1 Jahr weist er ein Mehrgewicht von 10 Pfund auf und ist weiterhin beschwerdefrei.

Auch bei den Ulcera duodeni war, wie die angeführten Beispiele zeigen, ein guter Erfolg zu erzielen. Auch Patienten, die schon eine Leube'sche Diätkur mitgemacht hatten, konnten noch erfolgreich behandelt werden.

Ein Fall sei hier noch aufgeführt. Es handelt sich um einen Kollegen, der ein einwandfreies Ulcus duodeni aufwies und nach 21 tägiger Sondenkur mit anschließender 8 tägiger Leub. D. K. beschwerdefrei ist. Der Fall liegt 2 Jahre zurück. Wir geben hier die Antworten, auf die ihn nach dem Norporth'schen Schema gestellten Fragen wieder:

„Haben Sie Hunger?“

Während der ersten 2—3 Tage um die Mittagszeit starkes Hungergefühl, das aber dann vollkommen verschwindet.

„Haben Sie Hunger in den Pausen nach dem Spritzen?“

Während der ersten Tage etwa 2—3 Stunden nach dem Spritzen Hungergefühl, das sich in der Folgezeit verliert. Unmittelbar nach dem Spritzen kein Hungergefühl, auch nicht während der Nacht.

„Haben Sie Hunger auf bestimmte Speisen?“

Vor allem auf stark gewürzte, pikante Speisen.

„Haben Sie Appetit auf Sondenkost?“

Absolut keinen, eher einen Widerwillen.

„Haben Sie Appetit auf Fleisch?“

Ja, Wild, geräucherten Schinken etc.

„Haben Sie nach dem Spritzen Sättigungsgefühl?“

Eine halbe Stunde nach dem Spritzen ein leichtes Völlegefühl, das dann verschwindet.

„Ist dieses Sättigungsgefühl verschieden von dem bei gewöhnlichen Essen?“

Während man bei gewöhnlichem Essen ein Gefühl angenehmer Sättigung empfindet, hat man nach der Sondenfütterung nur ein unangenehmes Völlegefühl und Gefühl des Aufgetriebenseins in der Oberbauchgegend — keine Kopfschmerzen bei Sondenfütterung.

„Haben Sie das Gefühl, als ob der Magen stets leer sei?“

Eigentlich nicht, jedoch auch nicht das Gefühl einer normalen Füllung des Magens.

„Haben Sie beim Spritzen Speichelfluß?“ -- Nein.

„Haben Sie Schmerzen beim Spritzen?“

Vor allem bei zu raschem Einlaufen (350 ccm in 15 Minuten) Herzklopfen, Übelkeit, Schweißausbruch und Rumoren im Leib.

„Sind Sie müde nach dem Spritzen?“

Leichte Müdigkeit, wie man sie nach reichlichen Mahlzeiten empfindet.

„Haben die Beschwerden während der Kur nachgelassen?“

Schlagartiges Verschwinden der anfangs sehr starken Schmerzen mit Beginn der Sondenkur.

„Haben Sie von dem Gespritzten irgendeinen Geschmack?“

Nein.

Wenn wir von den mit der Sonde behandelten 100 Fälle die ungeheilten abziehen, so bleiben etwa 80 Fälle übrig. Die sind alle über 1 Jahr und länger (bis 2 Jahre) beschwerdefrei. Von diesen 80 sind voll arbeitsfähig 74, 6 bedingt. In den 20 Fällen sind alle enthalten, die später zur Operation kamen, alle, die aus irgendwelchen Gründen bei den Nachuntersuchungen verloren gegangen sind.

Diesen 80, mit der Sonde behandelten Fälle habe ich nun wahllos 80 Fälle von *Ulcera ventriculi* und *duodeni* (40), die eine Leube'sche Diätkur in der Klinik mitgemacht haben, gegenübergestellt.

Bei diesem Vergleich fällt auf, daß die Gewichtsabnahme der Sondenbehandelten während der Sondenkur um rund 2 Pfund mehr ausmacht, als die Gewichtszunahme,

bei den mit Diätkur Behandelten während der gleichen Zeit. Die Gewichtsabnahme der Sondenbehandelten war während der ersten 14 Tage die größte, während sie dann zu einem gewissen Stillstand kam. Bei den Diätbehandelten war während der ersten 14 Tage durchschnittlich keine nennenswerte Gewichtszunahme zu verzeichnen. Nahmen nun die Sondenbehandelten während der nächsten 14 Tage noch ab, so hatten die Diätbehandelten schon ein durchschnittliches Mehrgewicht, verglichen mit dem Anfangsgewicht etwa um 3—4 Pfund. Begann jedoch nun bei den Sondenbehandelten die Diätkur, so machten sie den Gewichtsverlust schon in wenigen Tagen wett und nach 12 Tagen hatten sie durchschnittlich schon 2½ bis 3 Pfund zugenommen.

Verfolgten wir das Gewicht der mit der Sonde behandelten Patienten und der mit Leub. Diätkur Behandelten in den nächsten Monaten bis zu einem halben Jahr so muß man feststellen, daß die Sondenbehandelten nun stetig zunahmen und ein Mehrgewicht von 8—15 Pfund aufzuweisen hatten. Die mit Leube'scher Diät Behandelten haben nie die großen Gewichtszunahmen zu verzeichnen gehabt, meist wurde nach 3 Monaten ein gewisser Stillstand erreicht. Sobald sich wieder Schmerzen einstellten, wiesen sie eine rapide Gewichtsabnahme auf.

Bei den Sondenbehandelten ist bemerkenswert, daß, wie schon an Hand der aufgezeichneten Fälle erläutert wurde, sich die Schmerzen bis zu 2 Jahren periodisch nicht wiederholt haben und somit gut 75% als geheilt gelten dürfen.

Bei den mit Leube'scher Diät Behandelten war das periodische Auftreten der Schmerzen genau wie vor der Behandlung nur allzu häufig. Es trat wohl eine Besserung auf, indem die sonst zweimonatlich sich wiederholenden Schmerzen, sich nur ½ jährlich einstellten. Waren sie 3 Monate oder länger beschwerdefrei, so kamen sie doch größtenteils wieder mit den alten Beschwerden, während, wie eben gezeigt, die Sondenbehandelten auf Jahre geheilt angesehen werden können. Dieser tatsächlich länger dauernde Erfolg der Sondenbehandelten ist als „Dauererfolg“ bei einer großen Anzahl zu werten.

Die Überlegenheit der Sonde geht wohl auch daraus

hervor, daß Fälle, die vorher mit Leube'scher Diät behandelt wurden und nach geraumer Zeit ihre alten Beschwerden wieder bekamen, auf die Sondenkur hin bisher beschwerdefrei blieben.

Diejenigen Fälle die auch nach der zweiten Sondenkur verjagt haben, waren keine *Ulcera ventriculi*, sondern *Ulcera duodeni* mit sekundären Veränderungen, bei denen sich bei der Operation, wie schon einmal erwähnt periduodenale Verwachsungen zeigten. Auch sei nochmals betont, daß Patienten, die Blutungen auszuweisen hatten, sich auffällig rasch erholt haben.

Zusammenfassend sei gesagt, daß die Sondenbehandlung auf Grund der von uns gewonnenen Erfahrungen allen anderen internen Behandlungsarten überlegen ist. Der größte Erfolg bei der Behandlung ist in dem schlagartigen Aufhören der Schmerzen zu sehen. Siehe Kurve 4. Weiterhin steht fest, daß der Magen durch die auf ein Minimum herabgesetzte Peristaltik weitgehend geschont wird, die Sekretion ausgeschaltet und der mechanische Reiz der Speisen überhaupt wegfällt. Somit sind die für den erwünschten Erfolg, d. h. zur Heilung notwendigen Voraussetzungen, nämlich „Schonung des erkrankten Organes im höchsten Maße“ erfüllt.


Bei kritikvoller Auswahl der Fälle gelingt es mit der Sondenbehandlung in hohem Prozentsatz eine sofortige Beschwerdefreiheit zu erreichen, und soweit sich auf Grund unserer zweijährigen Erfahrung sagen läßt, auch die Dauer der Erfolge gegenüber allen anderen Kuren weitgehend zu verbessern. Solange uns noch kein Mittel zur Verfügung steht, die Ulcuskrankheit zu bekämpfen, muß die Sondenbehandlung in der internen Therapie in den Vordergrund gestellt werden.

---

Herrn Prof. L. R. Müller spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus für die Überlassung des Themas und freundliche Förderung meiner Arbeit. Gleichzeitig sei mir gestattet, an dieser Stelle Herrn Dr. med. H. U. Guizzetti für die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellten Krankengeschichten und für die vielseitigen Anregungen, zu danken.




Kurve 3



Zahl der täglichen Fütterungen  
und tägliche Nahrungsmenge

Kurve 4



- = Beschwerdefreiheit der Sondenbehandelten
  - = Beschwerdefreiheit der mit Leube'scher Diät-Kur Behandelten
- bei Gegenüberstellung von je 70 Fällen

## Literaturverzeichnis.

*Christensen, Oline:* Pathophysiology of Hunger Pains. Gastrographic and Titrimetric Investigations.

*Einhorn:* Die Duodenalsonde und ihre Anwendung.

*Müller, L. R.:* Die Lebensnerven und Lebenstriebe.

— Über Magenschmerzen und über deren Zustandekommen. Münchn. Med.Wo.Schr. 1919, Nr. 21.

— Über die Hungerempfindung.

*Morawitz-Henning:* Klin. Wochenschrift 1929, Nr. 15.

*Norpoth, Leo:* Die Bedeutung des Magens für die Entstehung der Hungerempfindung. Arch. f. Verdauungskrankh. Bd. 54/1933.

*Rehder, Hans:* Die Sondenbehandlung chronischer Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre.

— Anleitung für die Anwendung der Jejunalsonde. Münchn.Med.Wo.Schr. 1930 Nr. 11.

*Scholz u. Brugsch:* Klinisches Archiv.

---

## Lebenslauf.

Ich wurde am 16. Januar 1909 als Sohn des Medizinalrates Dr. August Schaumberg zu Windhuk (Südwestafrika) geboren. Von 1916—1920 besuchte ich die Volksschule bezw. Realschule zu Erlangen. Von 1920—1927 besuchte ich die Realschule zu Windhuk bis zur 6. Klasse und anschließend die English High School zu Windhuk und The Christian Brothers' College zu Kimberley, wo ich im Jahre 1927 die Universitätsreife erlangte. In diesem Jahre immatrikulierte ich mich an der Universität zu Erlangen und blieb an derselben bis zum Ende meines Studiums. Die ärztliche Vorprüfung legte ich 1930 in Erlangen ab und das Staatsexamen bestand ich am 26. Januar 1934.

---